

Link do produktu: <https://www.mksklep.pl/over-horse-pectosylium-1200-g-p-292.html>



OVER HORSE Pectosylium 1200 g

Cena	155.00 zł
Dostępność	5 dni roboczych
Czas wysyłki	5 dni roboczych
Numer katalogowy	28057
Producent	OVER HORSE

Opis produktu

Preparat odpiaszczający przewód pokarmowy. Zapobiega powstawaniu kolek u koni.

Zastosowanie

W różnych warunkach środowiskowych do przewodu pokarmowego konia razem z pobieranym pokarmem dostają się ziarna piasku i inne zanieczyszczenia.

Część piasku jest usuwana razem z odchodami ale część pozostaje w przewodzie pokarmowym zbierając się w jelitach.

Ten osadzający się piasek często jest przyczyną występujących u koni kolek.

Pectosylium jest substancją organiczną składającą się z włókna, które w jelitach tworzy żel wyłapujący i wiążący ziarenka piasku i kamyki.

Piasek i kamyki związane z żelem są łatwo usuwane z jelit.

PECTOSYLLIUM redukuje ryzyko wystąpienia kolek.

PECTOSYLLIUM oczyszcza jelita ze złogów piasku.

PECTOSYLLIUM to naturalne składniki, cukier i wanilia.

PECTOSYLLIUM jest smaczne, szybko i chętnie pobierane przez konie.

Skład

Łuski nasion Psyllium

Otręby pszenne

Słodzik

Aromat waniliowy

Dawkowanie

Najlepiej podawać wymieszane z paszą lub ziarnem.

Może być podawane bezpośrednio i jest zjadane chętnie i szybko.

Dawkowanie

W przypadku wystąpienia kolki:

podawać 100 g PECTOSYLLIUM dwukrotnie w ciągu dnia przez 6 kolejnych dni (1200g łącznie na każdego konia).

Zapobiegawczo:

Każdego miesiąca podając połowę zalecanej dawki tzn. 100 g raz dziennie przez 6 kolejnych dni.

Zapobiegawczo w sytuacji dużego ryzyka wystąpienia kolek: codziennie 50 g

Opakowanie:

1200 g

W każdym opakowaniu znajduje się miarka 100 g.

NIE ZAWIERA ANTIBIOTYKÓW ANI ŻADNYCH INNYCH LEKÓW

PORADA

Sprawdzanie obecności piasku w odchodach:

- Zebrać ekwiwalent jednego pełnego stolca. Upewnić się, że wraz z próbką z ziemi nie jest zbierany żaden brud ani piasek.
 - Umieścić próbkę w dużym wiadrze i zalać do pełna wodą, następnie dokładnie rozpuścić próbkę.
 - Po chwili odlać 3/4 górnego płynu oraz rozpuszczonych odchodów, następnie dolać wodę celem ponownego rozpuszczenia.
- Powtórzyć proces kilkakrotnie do czasu, gdy na dnie wiadra zostanie sam piasek.
- Jeżeli próbka zawiera więcej niż połowę łyżki stołowej piasku na jedną próbkę stolca, oznacza to, że Państwa koń ma w

swoim ustroju znaczną ilość piasku i wymaga leczenia. Niewielka ilość piasku jest zjawiskiem normalnym