

Link do produktu: <https://www.mksklep.pl/st-hippolyt-hesta-plus-zn-cynk-1000-g-p-10104.html>



ST HIPPOLYT Hesta Plus ZN Cynk 1000 g

Cena	159.00 zł
Dostępność	5 dni roboczych
Czas wysyłki	5 dni roboczych
Numer katalogowy	70069
Producent	ST HIPPOLYT

Opis produktu

Cynk odpowiada za prawidłowy wzrost rogu kopytowego, a także stan okrywy włosowej (regeneracja skóry i błon śluzowych). Ponadto przyspiesza gojenie ran, a także wrzodów przewodu pokarmowego.

Właściwości

Cynk jest składnikiem wielu enzymów w przemianach węglowodanów i białek.

Odpowiada za prawidłowy wzrost rogu kopytowego, a także stan okrywy włosowej (regeneracja skóry i błon śluzowych). Ponadto przyspiesza gojenie ran, a także wrzodów przewodu pokarmowego.

Skutki niedoboru:

zmiany skórne takie jak wypadanie włosów, łuszczenie i swędzenie skóry, letnie wypryski
zaburzenia immunologiczne (infekcje, alergie)
problemy z płodnością
słabej jakości róg kopytowy
zaburzenia jelitowe

Zwiększone zapotrzebowanie u koni podczas:

gojenia się ran
zwiększonego udziału kwasu fitynowego w diecie (karmienie ziarnem zbóż)
wysokiej podaży miedzi i wapnia w diecie
infekcji skórnych
zwiększonej wrażliwości na ukąszenia owadów

Skład:

Białko jęczmieńne,
Białko drożdżowe, olej słonecznikowy, olej z pestek słonecznika, 10%,
mieszanka olejowa (siemina lniana, pestki słonecznika), 10%,
czosnek, ocet.

Składniki / strawność:

20,0% białka surowego

Włókno surowe 6,0%

Tłuszcz surowy 4,0%

Popiół surowy 9,0%

Analiza

Wapnia 0,1%

0,5% fosforu

0,3% magnezu

Witaminy i pierwiastki śladowe na kg:

cynk 30.000 mg (chelate)

Miedź 80 mg

żelazo 220 mg

mangan 150 mg

kobalt 50 mg

biotyna 360 mcg
selen 0,6 mg
jod 0,6 mg
witamina A 14.000 IE
witamina D3 1.400 IE
witamina B1 8,5 mg
witamina B2 14 mg
witamina B6 4 mg
witamina B12 42 mcg
kwas pantotenowy 17 mg
cholina 214 mg
kwas nikotynowy 463 mg
kwas foliowy 4 mg

Dawkowanie:

3-5 g na 100 kg masy ciała, na dzień

Sposób podania

naprzemiennie, tzn. 5 dni Hesta Plus CYNK, potem 2 dni wolnego.

Przy specjalnym zapotrzebowaniu Hesta Plus ZINC może być podawany przez dłuższy okres czasu

Czas trwania leczenia:

Zwykle od 6 do 9 miesięcy, a następnie w razie potrzeby.

Następnie należy skontrolować badaniem krwi

Opakowanie

1000 g